




RATS & SOURIS – BLOCS 300 g



Spécial rats et souris résistants

Efficacité maximale

Idéal pour lieux humides tels
qu'autour des bâtiments, garages,
caves

Possible

Optimale

J F M A M J J A S O N D

INFORMATIONS
PRODUIT

Code	Conditionnement	EAN	PCB
ERSBL300	Étui 300 gr	3664715080473	12



**DONNÉES
RÉGLEMENTAIRES**

Homologation	NAKKA®. AMM FR-2019-0007.
Composition	Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0025 % m/m.
Classement	ATTENTION. SGH08. H373.

MODE D'EMPLOI

Appât en bloc prêt à l'emploi à utiliser dans des stations d'appât sécurisés et étiquetés conformément aux recommandations relatives au produit. Ce produit contient un agent amérissant et un colorant. Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple). Envisager l'adoption de mesures de contrôles préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer

l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. Ne pas utiliser de rodenticides anticoagulants en guise d'appâts permanents (par exemple, pour éviter toute infestation de rongeurs ou pour détecter l'activité de rongeurs). En cas de soupçon d'inefficacité à la fin du traitement, l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

	SOURIS (INTÉRIEUR)	RATS (INTÉRIEUR/AUTOUR DES BÂTIMENTS)
DOSE	20-40 g d'appât par point d'appât soit 2 à 4 blocs . Si plusieurs postes d'appâtage sont nécessaires, la distance minimale séparant deux postes doit être de 5 mètres .	100-200 g d'appât par point d'appât soit 10 à 20 blocs . Si plusieurs postes d'appâtage sont nécessaires, la distance minimale séparant deux postes doit être de 5 mètres .
POSITIONNEMENT	Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.). Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures. Pour une utilisation autour des bâtiments : placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.	
CONTRÔLE ET SUIVI	Les stations / postes d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement (contre les souris) ou que 5 à 7 jours après le début du traitement (contre les rats) , puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres des rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.	

**PRECAUTIONS
D'EMPLOI**

Avant : Utiliser les biocides avec précaution. Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser. Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile. Pendant : Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles. Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers. Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés. Recharger le poste d'appâtage si besoin. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Après : Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Éliminer les cadavres de rongeurs dans un circuit de collecte approprié. Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement. Une fois le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié. Stocker dans un endroit frais, sec et ventilé, dans l'emballage commercial fermé et à l'abri de la lumière directe du soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage. Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues ; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer. L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.