

BOVIFORM

VACHE TARIE VITAMINE

ALIMENT COMPLEMENTAIRE DIETETIQUE
BOLUS POUR BOVINS



ESPECES



OBJECTIF NUTRITIONNEL : Apport prolongé en oligo-éléments et vitamines chez les animaux à l'herbage.

PROPRIETES : **BOVIFORM VACHE TARIE Vitaminé** apporte tous les oligo-éléments et les vitamines nécessaires aux vaches reproductrices, vaches tarées pendant la période du tarissement en complément de la ration de base (pâturage; foin...) et vaches allaitantes en préparation au vêlage et ou à la reproduction (pâturage ou en alimentation hivernale).
Diffuse pendant 3 mois.

COMPOSITION : Oxyde de magnésium, carbonate de calcium, sel de magnésium d'acide stéarique et d'acide palmitique.
Le bolus contient 16,5% de fer inerte

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Cendre brutes (66,3%); matière grasse brutes (2,2%); protéine brute (0%); cellulose brute (0%); magnésium (4,1%); calcium (1,1%); sodium (0,3%); phosphore (0%).

ADDITIFS AU KG

Oligo-éléments

Zinc (3b603) (oxyde de zinc)	177 338 mg
Cuivre (3b402) (Dihydroxycarbonate de cuivre II monohydraté)	60 040 mg
Manganèse (3b502) (oxyde de manganèse)	53 382 mg
Cobalt (3b303)(carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt II)	5 928 mg
Iode (3b202) (iodate de calcium)	2 400 mg
Sélénium (3b801) (sélénite de sodium)	1 820 mg

Vitamines

Vitamine A (3a672a)	46 600 000 UI
Vitamine E (3a700)	91 168 UI

PRESENTATION

Bolus

Conditionnement

Boîte de 10
bolus de 110 gr

Boîte de 50
bolus de 110 gr



Produit certifié
FCA-OVOCOM

Création : 09/2019

PERIODE DE DISTRIBUTION

Vaches laitières : au tarissement

Vaches allaitantes : 1 à 2 mois avant
vêlage ou 1 mois après vêlage.

Taux de libération journalier :

216 mg de Zinc
62 mg de manganèse
73,4 mg de cuivre
7,2 mg de cobalt
2,9 mg d'iode
2,2 mg de sélénium
56 955 UI de Vitamine A
110 UI de vitamine E

MODE D'EMPLOI

**Vaches au tarissement ou vaches
allaitantes** : faire avaler 1 seul bolus
à l'aide d'un lance bolus selon les
précautions d'usage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

-Avant utilisation, il est recommandé de consulter un vétérinaire ou un nutritionniste au sujet du dosage des oligo-éléments dans la ration et du statut en oligo-éléments du troupeau.

-La supplémentation simultanée en additifs présentant une teneur maximale à partir de sources autres que celles incorporées dans un bolus doit être évitée.

- Ne pas administrer aux ovins.

CONSERVATION

Fabriqué 18 mois avant la date de durabilité minimale indiquée.