

# LARVENOL

## FICHE TECHNIQUE

# LARVENOL<sup>CAPS</sup>

LARVICIDE CONCENTRE À DILUER  
Formule spécifique à base de S-méthoprene

USAGE BIOCIDES UNIQUEMENT

### Formulation

Substance active	S-méthoprene CAS n°65733-16-6
Concentration	51,5 g/L
Forme	Liquide concentré Formule micro-encapsulée

### Usages

Nom déclaré (Simmbad) : **LARVOX CAPS**

Usages : **Larvicide actif sur les larves de ténébrions et de mouches**

Utilisateurs : **Réservé à un usage professionnel**

Le **LARVENOL CAPS** peut être utilisé en présence des animaux.

### Action

La substance active, le S-Méthoprene, agit en tant que régulateur de croissance chez les insectes. Elle perturbe le cycle de développement et empêche les larves et les nymphes de devenir adulte, ce qui entraîne une nette diminution de la population.

### Dose d'application

Diluer 1L de **LARVENOL CAPS** dans 250 litres d'eau pour traiter 500m<sup>2</sup> de surface.

Avant dilution, bien mélanger la solution et remplir le réservoir du pulvérisateur à la moitié de son volume.

Verser la dose nécessaire de **LARVENOL CAPS** dans le pulvérisateur. Remplir le réservoir du pulvérisateur avec de l'eau afin d'obtenir le volume final souhaité.

Les dilutions préparées doivent être utilisées dans les 24 heures. Pendant le traitement, la solution doit être agitée de temps en temps si elle n'est pas utilisée pendant plusieurs heures.



### Référence & Conditionnement

Réf. **I7138** : Flacon de 1 L – Carton de 6 flacons

### Précautions particulières

TP18. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et pour l'environnement.

**Utiliser les biocides avec précautions.** Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur le site [www.lodi.fr](http://www.lodi.fr).

Porter des gants et se laver les mains après manipulation.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement.

Aérer pendant tout le traitement et ventiler à fond à la fin du traitement. Après application, nettoyer le matériel utilisé à l'eau savonneuse.

Respecter les doses, l'usage et les conditions d'emploi mentionnées sur l'emballage.

Ne pas traiter les animaux. Eviter le contact direct avec les animaux durant l'application. Ne pas traiter les mangeoires et les abreuvoirs.

Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre antipoison le plus proche.

# LARVENOL<sup>CAPS</sup>

LARVICIDE CONCENTRE À DILUER  
Formule spécifique à base de S-méthoprène

USAGE BIOCIDÉ UNIQUEMENT

### Mode d'emploi

**Pour une application en élevage de volailles de chair SUR LES LARVES DE TENEBRIONS : poulets, dindes, pintades, gibier :** Traiter la totalité de la litière à la fin du vide sanitaire avant le démarrage de la nouvelle bande pour lutter contre les larves de ténébrions. traiter en cas de ré infestation en cours de bande sous les abreuvoirs et les assiettes d'alimentation.

**Pour une application en élevage de poules pondeuses et poules reproductrices :**

Traiter la totalité des fientes en insistant sur le haut des andins dans les bâtiments de stockage de fientes et sur les caillebotis en élevage de poules au sol pour lutter contre les larves de mouches.

**Pour une application en porcherie :**

**Sur caillebotis intégral :** Traiter la totalité de la surface contre les larves de mouches et les larves de ténébrions. Renouveler en cas de vidange des fosses à déjection

**Sur caillebotis partiel :** Appliquer au niveau des caillebotis ainsi qu'autour des abreuvoirs et le long des murs et des cloisons contre les larves de mouches et les larves de ténébrions.

**Pour une application en élevage de ruminants (vaches laitières, veaux, moutons, chèvres, bovins) :**

Sur litière épaisse, traiter sur 50cm le long des murs autour des poteaux sous les abreuvoirs et les auges. Appliquer **LARVENOL CAPS** au niveau de chaque couche de litière, en répétant le traitement pour chaque augmentation de 10cm de hauteur de litière toutes les 8 semaines contre les larves de mouches de moucheron et les vers à queue.

**Pour une application extérieure :**

Préfosses, fosses, sorties de raclours, tas de fumier extérieur : traiter sur toute la surface contre les larves de mouches de moucheron et les vers à queue.

La persistance d'action de **LARVENOL CAPS** est de 8 semaines après application. Renouveler le traitement si nécessaire.

